

Protocol de premedicació previ a l'administració de contrastes iodats

Observacions

Són factors de risc de possible reacció: edat avançada, insuficiència renal, cardiopatia avançada, deshidratació, antecedent de reacció prèvia amb contrast iodat, tractament amb beta-blocants.

En cas que es conegui el contrast implicat, cal utilitzar-ne un de diferent, de baixa osmolaritat.

En cas que no es conegui, cal considerar la indicació o no de la prova i l'existència d'exploracions complementàries alternatives.

L'ús de premedicació amb antihistamínics pot ser eficaç en la prevenció de reaccions per alliberament inespecífic d'histamina. No hi ha dades concloents de que la premedicació amb corticoides (amb/sense antihistamínics) sigui efectiva en la profilaxi de reaccions adverses, en especial les moderades i greus, amb l'ús de contrastes iodats

Premedicació en exploracions programades:

1. Prednisona 30 mg via oral, 12h - 6h - 1h abans de la prova d'imatge
2. Cetirizina 10 mg via oral, 12h - 6h - 1h abans de la prova d'imatge

Premedicació en exploracions urgents:

1. Hidrocortisona 200 mg via endovenosa, 1h abans de la prova d'imatge (alternativa: metilprednisolona 60 mg via endovenosa)
2. Dexclorfeniramina 5 mg via endovenosa, 1h abans de la prova d'imatge